

sustancia aun con las repercusiones sociales, psicológicas, y/o consecuencias físicas. La adicción es a menudo (pero no siempre) acompañada por la dependencia física, tolerancia, y síndrome de abstinencia. La dependencia física se define como el estado de adaptación fisiológica a una sustancia. La ausencia de esta sustancia produce síntomas, y signos del síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se caracteriza a menudo por el exceso de actividad de las funciones fisiológicas que eran reprimidas por la droga, y/o depresión de las funciones que eran estimuladas por la droga. Los opiáceos a menudo causan sueño, calma, y estreñimiento, así que la abstinencia a menudo causa insomnio, ansiedad, y diarrea.

### Tratamiento

La mayoría de los centros de tratamiento en los Estados Unidos no ofrecen tratamiento asistido con medicina. Aunque debido a la potencia del Oxycontin y su gran potencial de adicción, complicaciones médicas se incrementan cuando se para el consumo de repente. Abstinencia prematura puede causar que el paciente recurra al uso de heroína sin saber la cualidad de la droga. Además, si se inyectan heroína se están exponiendo a contraer SIDA y hepatitis. La mayoría de las personas adictas a Oxycontin necesitan tratamiento con medicamentos. Aun si las personas han usado Oxycontin legítimamente para controlar el dolor, no deben de parar el uso de la droga súbitamente. Sino que, las dosis deben de ser reducidas, poco a poco hasta que la droga no se necesita más. Es importante referir a los pacientes a los centros donde pueden recibir el tratamiento apropiado.

### Notas:


1. National Drug Intelligence Center, "Information Bulletin: Oxycontin Diversion and Abuse," retrieved March 7, 2001, from the World Wide Web, [www.usdoj.gov/ndic/pubs/651/default.aspx](http://www.usdoj.gov/ndic/pubs/651/default.aspx).
2. Ibid.
3. National Institute on Drug Abuse, "Pain Medications: 13553," retrieved February 15, 2001, from the World Wide Web, 165.112.78.61/infobox/Pain-Med.aspx.
4. Ibid.

### Referencias

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  
Substance Abuse and Mental Health Services Administration  
Center for Substance Abuse Treatment, [www.samhsa.gov](http://www.samhsa.gov),  
*Advisory Article, April 2001, volume1, Issue 1*



# Preguntas sobre el Oxycontin



*Florida BRITE Project*

**Florida Department of Children & Families**  
**Substance Abuse Program Office**  
**1317 Winewood Blvd., Bldg 6, Rm 300**  
**Tallahassee, FL 32399**  
**Tel: (850) 488-2755**

# Oxycontin

## ¿Qué es el Oxycontin?

Oxycontin es un analgésico opiáceo semi-sintético que se prescribe para dolores crónicos o dolores que duran por mucho tiempo. El ingrediente activo es el "oxycodone". Este ingrediente se encuentra también en drogas como "Percodan" y "Tylox". Aunque, Oxycontin contiene entre 10 y 160 miligramos de oxycodone en una tableta de difusión regulada. Los medicamentos para quitar el dolor como Tilos contienen 5 miligramos de oxycodone y a menudo requieren repetir la dosis para aliviar el dolor porque no tienen la fórmula de difusión de tiempo.

## ¿Como se usa el Oxycontin?

Oxycontin, también llamado por nombres callejeros como "Oxy", "O.C.", y "killer", es legítimamente prescrito como una tableta de difusión regulada, que provee hasta 12 horas de alivio en dolores crónicos. Es a menudo prescrita a pacientes de cáncer o aquellos con dolores crónicos de espalda. El beneficio de esta medicina para las personas que sufren de dolores crónicos es que solamente tienen que tomar una capsula dos veces al día, mientras que otras medicinas requieren un uso más frecuentes para controlar el dolor. La meta del tratamiento de dolores crónicos es reducir el dolor y mejorar el funcionamiento.

## ¿Cómo se abusa el Oxycontin?

Los que abusan con Oxycontin pueden triturar la pastilla y tomarla oralmente, inhalarla por la nariz, o diluirla en agua e inyectársela. Triturar o diluir la pastilla destruye el mecanismo de difusión regulada, causando un poderoso y rápido efecto eufórico "High". Adictos han comparado este efecto de euforia con el que produce la heroína. En realidad en algunas áreas, el uso de heroína es eclipsado por el abuso de Oxycontin.

El fabricante de Oxycontin "Purdue Pharma" ha tomado medidas para reducir el potencial de abuso de esta medicina. Su página Web menciona las siguientes iniciativas dirigidas a disminuir el uso ilícito de Oxycontin:

Proveyendo cuadernos de recetas a prueba de falsificación han desarrollado y distribuido más de 400,000 folletos educacionales para distribuir en las farmacias y a los profesionales de salud sobre el uso indebido, trabajando con oficiales de salud y del orden público para tratar el problema de abuso de la droga, y ayudando a financiar un estudio sobre prácticas para mejorar y monitorear los programas de prescripciones de drogas. Además, la compañía está tratando de desarrollar otras drogas para disminuir el dolor, que sean más difíciles de desviar hacia el abuso. La compañía estima que tomará bastante tiempo para poder traer al mercado esos productos. Para más información, visite la página Web de Purdue Pharma [www.purduepharma.com](http://www.purduepharma.com) o llame al teléfono 203-588-8069.

## ¿Cuál es la diferencia entre el abuso de Oxycontin y otras drogas prescritas para el dolor?

El abuso de las drogas prescritas para el dolor no es nada nuevo. Aunque hay dos razones principales para separar el abuso de Oxycontin con el abuso de otras drogas. Primero, Oxycontin es una droga poderosa que contiene una cantidad mayor de su ingrediente activo, oxycodone, que otras medicinas para controlar el dolor. Al triturar la pastilla y tomarla, inhalarla por la nariz, o inyectarse el Oxycontin diluido, los que abusan de esta droga sienten una poderosa euforia rápidamente, en lugar de en un periodo de más de 12 horas de duración. En segundo lugar, la venta ilegal de Oxycontin ofrece la posibilidad de grandes ganancias de dinero. Una pastilla de 40 miligramos con prescripción cuesta aproximadamente \$4 y en la calle se vende ilegal entre \$20 a \$40 dólares, dependiendo del área del país donde se venda la droga. (1)

Oxycontin es comparativamente barata si se obtiene legalmente con prescripción médica y el costo está cubierto por un seguro médico. Si embargo el "National Drug Intelligence Center" reporta que los adictos usan heroína si el seguro no le cubre por la prescripción de Oxycontin., porque la heroína es más barata que el Oxycontin que se obtiene ilegalmente. (2)

## ¿Cuáles son las posibilidades de que una persona a la que se le ha prescrito Oxycontin se convierta en un adicto?

La mayoría de las personas que toman Oxycontin por prescripción médica no se convierten en adictos. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. "The National Institute on Drug Abuse (NIDA)" reporta que: "Con el uso prolongado de opiáceos, los usuarios se vuelven más tolerantes, y requieren mayores dosis, y pueden adquirir dependencia física de la droga....Los estudios indican que la mayoría de los pacientes que reciben terapia por períodos prolongados no se convierten en adictos a estas drogas." (3) En un estudio financiado por NIDA "se encontró que solamente cuatro de más de 12,000 pacientes que tomaron fuertes dosis de opiáceos para dolores agudos se convirtieron en adictos. En un estudio de 38 pacientes crónicos, donde la mayoría de ellos tomó la droga por un período de 4 a 7 años, solamente 2 pacientes se convirtieron en adictos, y los dos tenían historia de adicción." (4) En resumen, la mayoría de los individuos que toman Oxycontin o cualquier otro opiáceo por prescripción médica no se convierten en adictos aunque pueden crear dependencia y necesitar ayuda médica para lograr abstinencia. Las personas que toman la droga por prescripción médica, deben de continuar usándola, siempre y cuando la persona y el médico estén de acuerdo en que el uso es apropiado para controlar el dolor.

## ¿Cuándo ocurren dependencia y adicción juntas?

Cuando el paciente toma el narcótico analgésico de acuerdo con las instrucciones del médico, o al punto que el dolor esté adecuadamente controlado, no se considera abuso o adicción. El abuso ocurre cuando el paciente ingiere más droga de la necesaria para controlar el dolor, especialmente si la toman para sentir euforia. Los pacientes que ingieren los medicamentos de una manera que difiere enormemente con las instrucciones del médico están probablemente abusando la droga. Si el paciente continua pidiendo la droga aun cuando el dolor se ha controlado, probablemente esté adicto. La adicción se caracteriza por el uso compulsivo y repetitivo de la